

AC(ADR+CPA)

乳癌

術後補助

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

- 【投与量】 [1] ドキシソルビシン アドリアシン
体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 60 (mg/m²) = [] mg → [] mg
- [2] シクロホスファミド エンドキサン
体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 600 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 3週間毎(4サイクルまで)

		1 日目	2~3 日目	4~21 日目	22 日目
↓治療内容					
内服	① イメンドカプセル	125mg 点滴前	80mg 朝食後	—	次の サイ クル
	② デカドロン錠	—	15錠 毎食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	
	② グラニセトロンバッグ100mL + デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	
	③ ドキシソルビシン [] mg + 生理食塩水 【100mL】	15min	—	—	
	④ シクロホスファミド [] mg + 生理食塩水 【100mL】	30min	—	—	
	⑤ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	
	⑥ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	

【注意事項】

血管外漏出注意

閉鎖式接続器具 (ケモセーフ)を使用すること