

wPTX(パクリタキセル) + T-mab

乳癌

術後補助

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] トラスツズマブ (ハーセプチン)

-選択- 体重が [] Kgなので → 体重(Kg) × [] (mg/Kg) → [] mg → [] mg

[2] パクリタキセル体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 80 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 1週間毎 12サイクル(その後T-mab単独40サイクル)

↓治療内容		1 日目	2~3 日目	4~7 日目	8 日目
内服	① レスタミン錠10mg	5錠 点滴前	—	—	次の サイ クル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	
	② ファモチジン注20mg×1管+デキサート3.3mg ×3管+生理食塩水【100mL入】	15min	—	—	
	③ グラニセトロンバック100mL	30min	—	—	
	③ パクリタキセル [] mg + 生理食塩水【100mL入】	60min	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	
	⑤ トラスツズマブ [] mg + 生理食塩水【250mL入】	初回 2回目~60min	—	—	
	⑥ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	
⑦ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—		

【注意事項】

フィルター必須 専用ルートが必要

投与直後のアナフィラキシー注意

異常あれば中止しDrCallする

パクリタキセル→アルコール過敏症に禁忌。

アルコール含有の為、施行日は運転禁止を伝える(飲酒運転になる)。