

FEC(5-FU + EPI+CPA)

乳癌

進行・再発

患者ID	身長	氏名	体重	年齢	性別	Ccr
	cm		Kg	体表面積(BSA)	m ²	

- 【投与量】 [1] フルオロウラシル (5-FU)
体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 500 (mg/m²) = [] mg → [] mg
- [2] エピルピシン
体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 100 (mg/m²) = [] mg → [] mg
- [3] シクロホスファミド (エンドキサン)
体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 500 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 3週間毎(4サイクルまで)

↓治療内容		1 日目	2～3 日目	4～21 日目	22 日目
内服	① イメンドカプセル	125mg 点滴前	80mg 朝食後	—	次の サイ クル
	② デカドロン錠	—	15錠 毎食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	
	② グラニセトロンバッグ100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	
	③ エピルピシン [] mg + 原液のまま投与	5min	—	—	
	④ シクロホスファミド [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL】	30min	—	—	
	⑤ フルオロウラシル [] mg + 生理食塩水【100mL】	15min	—	—	
⑥ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—		
⑦ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—		

【注意事項】

血管外漏出注意

閉鎖式接続器具 (ケモセーフ)を使用すること

エピルピシンは製剤液そのままを投与する。真っ赤な薬で、投与後1-2日は尿も赤くなる(血ではない)

フッ化ピリミジン系薬 (フルオロウラシル) → 口内炎注意