

mFOLFOX6 + P-mab

大腸癌 進行・再発 1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

- 【投与量】
- [1] パニツムマブ (ベクティビックス)
 体重が [] Kgなので → 体重(Kg) × 6 (mg/Kg) → [] mg → [] mg
 - [2] オキサリプラチン
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 85 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [3] レポホリナート
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 200 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [4] フルオロウラシル(急速) (5-FU)
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 400 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [5] フルオロウラシル(持続) (5-FU)
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 2400 (mg/m²) = [] mg → [] mg
- 【スケジュール】 2週間毎

↓治療内容		1 日目	2 日目	3 日目	4~14 日目	15 日目
内服	① レスタミン錠10mg	5錠 点滴前	—	—	—	次の サイ クル
	② ミノサイクリン錠100mg	2錠 朝夕食後	2錠 朝夕食後	2錠 朝夕食後	(2錠 朝夕食後)	
	③ ヒルドイドローション	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	
	④ デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	15錠 毎食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	—	
	③ パニツムマブ [] mg + 生理食塩水【全量で100mL】	初回90min 2回目~60min	—	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	
	⑤ オキサリプラチン [] mg +	120min	—	—	—	
	⑥ 5%ブドウ糖液【250mL入】					
	同時 ⑥ レポホリナート [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL入】	120min	—	—	—	
	⑦ フルオロウラシル [] mg + 5%ブドウ糖液【50mL入】	15min	—	—	—	
	⑧ フルオロウラシル(div) [] mg + 5%ブドウ糖液【500mL入】	46hr	46hr	46hr	—	
⑨ 生理食塩水 【20mL入】	—	—	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—		

【注意事項】

オキサリプラチンは必ずブドウ糖で溶解する。
 口内炎注意