

mFOLFOX6 + C-mab

大腸癌 進行・再発 1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

- 【投与量】
- [1] セツキシマブ (アービタックス)
 一選択- BSAが [] m²なので → BSA(m²) × (mg/m²) → [] mg → [] mg
 - [2] オキサリプラチン
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 85 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [3] レボホリナート
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 200 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [4] フルオロウラシル(急速) (5-FU)
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 400 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [5] フルオロウラシル(持続) (5-FU)
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 2400 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 2週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~7 日目	8 日目	9~14 日目	15 日目
内服	① レスタミン錠10mg	5錠 点滴前	—	—	5錠 点滴前	—	次の サイ クル
	② ミノサイクリン錠100mg	2錠 朝夕食後	2錠 朝夕食後	(2錠 朝夕食後)	2錠 朝夕食後	(2錠 朝夕食後)	
	③ ヒルドイドローション	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	
	④ デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	ルート 確保用	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	—	—	
	③ セツキシマブ [] mg + 生食【初回500mL、2回目以降250mL】	初回90min 2回目~60min	—	—	60min	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	セツキシマ ブと同速度	—	—	セツキシマ ブと同速度	—	
	⑤ オキサリプラチン [] mg +	120min	—	—	—	—	
	⑥ 5%ブドウ糖液【250mL入】						
	⑥ レボホリナート [] mg +	120min	—	—	—	—	
	⑦ 5%ブドウ糖液【250mL入】						
	⑦ フルオロウラシル [] mg +	15min	—	—	—	—	
⑧ 5%ブドウ糖液【50mL入】							
⑧ フルオロウラシル(div) [] mg +	46hr	46hr	—	—	—		
⑨ 5%ブドウ糖液【500mL入】							
⑨ 生理食塩水 【20mL入】	—	CV#-ト有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	—		

【注意事項】

- オキサリプラチンは必ずブドウ糖で溶解する。
- 口内炎注意
- フッ化ピリミジン系薬(フルオロウラシル)⇒口内炎注意
- セツキシマブ⇒皮膚障害に注意