



| | | | |
|-------|-------|--------------------------|-----|
| 患者ID | 氏名 | 年齢 | 性別 |
| 身長 cm | 体重 Kg | 体表面積(BSA) m ² | Ccr |

- 【投与量】
- [1] ベバシズマブ (アバスチン)
 体重が [] Kgなので → 体重(Kg) × 5 (mg/Kg) → [] mg → [] mg
 - [2] イリノテカン
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 150 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [3] レポホリナート
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 200 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [4] フルオロウラシル(急速) (5-FU)
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 400 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [5] フルオロウラシル(持続) (5-FU)
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 2400 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 2週間毎

| ↓治療内容 | | 1 日目 | 2 日目 | 3 日目 | 4~14 日目 | 15 日目 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------|------------|------------|----------|
| 内服 | ① デカドロン錠0.5mg | — | 15錠 毎食後 | 15錠 毎食後 | — | 次のサイクル |
| 点滴 | ① 生理食塩水 【100mL入】 | ルート 確保用 | — | — | — | |
| | ② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管 | 15min | — | — | — | |
| | ③ ベバシズマブ [] mg + 生理食塩水【全量で100mL】 | 初回90min 2回目~60min | — | — | — | |
| | ④ 生理食塩水 【50mL入】 | 全開 | — | — | — | |
| | ⑤ イリノテカン [] mg + | — | — | — | — | |
| | ⑥ 5%ブドウ糖液【250mL入】 | 120min | — | — | — | |
| | 同時 レポホリナート [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL入】 | 120min | — | — | — | |
| | ⑦ フルオロウラシル [] mg + 5%ブドウ糖液【50mL入】 | 15min | — | — | — | |
| | ⑧ フルオロウラシル(div) [] mg + 5%ブドウ糖液【500mL入】 | 46hr | 46hr | 46hr | — | |
| ⑨ 生理食塩水 【20mL入】 | — | — | CVポート有 患者のみ使用 (ロック用) | — | | |

【注意事項】

口内炎注意

フッ化ピリミジン系薬(フルオロウラシル)⇒口内炎注意