



患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] セツキシマブ (アービタックス)

—選択— BSAが [] m²なので ⇒ BSA(m²) × (mg/m²) ⇒ [] mg ⇒ [] mg

[2] イリノテカン

体表面積(BSA) が [] m²なので ⇒ BSA(m²) × 150 (mg/m²) = [] mg ⇒ [] mg

[3] レボホリナート

体表面積(BSA) が [] m²なので ⇒ BSA(m²) × 200 (mg/m²) = [] mg ⇒ [] mg

[4] フルオロウラシル(急速)

体表面積(BSA) が [] m²なので ⇒ BSA(m²) × 400 (mg/m²) = [] mg ⇒ [] mg

[5] フルオロウラシル(長時間)

体表面積(BSA) が [] m²なので ⇒ BSA(m²) × 2400 (mg/m²) = [] mg ⇒ [] mg

【スケジュール】 2週間毎

↓ 治療内容		1	2~3	4~7	8	9~14	15
		日目	日目	日目	日目	日目	日目
内服	① レスタミン錠10mg	5錠 点滴前	—	—	5錠 点滴前	—	次の サイ クル
	② ミノサイクリン錠100mg	2錠 朝夕食後	2錠 朝夕食後	(2錠 朝夕食後)	2錠 朝夕食後	(2錠 朝夕食後)	
	③ ヒルドイドローション	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	1日数回 塗布	
	④ デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	ルート 確保用	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	—	—	
	③ セツキシマブ [] mg + 生食【初回500mL、2回目以降250mL】	初回90min 2回目~60min	—	—	60min	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	セツキシマ ブと同速度	—	—	セツキシマ ブと同速度	—	
	⑤ イリノテカン [] mg +	—	—	—	—	—	
	⑥ 5%ブドウ糖液【250mL入】	120min	—	—	—	—	
	同時 レボホリナート [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL入】	120min	—	—	—	—	
	⑦ フルオロウラシル [] mg + 5%ブドウ糖液【50mL入】	15min	—	—	—	—	
	⑧ フルオロウラシル(div) [] mg + 5%ブドウ糖液【500mL入】	46hr	46hr	—	—	—	
⑨ 生理食塩水 【20mL入】	—	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	—		

【注意事項】

口内炎注意

フッ化ピリミジン系薬(フルオロウラシル)⇒口内炎注意

セツキシマブ⇒皮膚障害に注意