

FOLFIRI + R-mab

大腸癌 進行・再発 1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] ラムシルマブ (サイラムザ)

体重が [] Kgなので → 体重(Kg) × 8 (mg/Kg) → [] mg → [] mg

[2] イリノテカン

体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 150 (mg/m²) = [] mg → [] mg

[3] レボホリナート

体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 200 (mg/m²) = [] mg → [] mg

[4] フルオロウラシル(急速) (5-FU)

体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 400 (mg/m²) = [] mg → [] mg

[5] フルオロウラシル(持続) (5-FU)

体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 2400 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 2週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2 日目	3 日目	4~14 日目	15 日目
内服	① デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	15錠 毎食後	—	次のサイクル
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	—	
	③ ラムシルマブ [] mg + 生理食塩水【全量で250mL】	初回90min 2回目~60min	—	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	
	⑤ イリノテカン [] mg +	—	—	—	—	
	⑥ 5%ブドウ糖液【250mL入】	120min	—	—	—	
	同時 レボホリナート [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL入】	120min	—	—	—	
	⑦ フルオロウラシル [] mg + 5%ブドウ糖液【50mL入】	15min	—	—	—	
	⑧ フルオロウラシル(div) [] mg + 5%ブドウ糖液【500mL入】	46hr	46hr	46hr	—	
⑨ 生理食塩水 【20mL入】	—	—	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—		

【注意事項】

口内炎注意

フッ化ピリミジン系薬(フルオロウラシル)⇒口内炎注意