

FOLFOXIRI + B-mab

大腸癌 進行・再発 1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

- 【投与量】
- [1] ベバシズマブ (アバスチン)
 体重が [] Kgなので → 体重(Kg) × 5 (mg/Kg) → [] mg → [] mg
 - [2] イリノテカン
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 150 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [3] オキサリプラチン
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 85 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [4] レボホリナート
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 200 (mg/m²) = [] mg → [] mg
 - [5] フルオロウラシル (5-FU)
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 3200 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 2週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2 日目	3 日目	4~14 日目	15 日目
内服	① デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	15錠 毎食後	—	次のサイクル
	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	—	
点滴	② グラニセトロンバック100mL + デキサート3.3mg × 3管	15min	—	—	—	
	③ ベバシズマブ [] mg + 生理食塩水【全量で100mL】	90min 2回目~60min	—	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	
	⑤ イリノテカン [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL入】	60min	—	—	—	
	⑥ オキサリプラチン [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL入】	120min	—	—	—	
	⑦ レボホリナート [] mg + 5%ブドウ糖液【50mL入】	120min	—	—	—	
	⑧ フルオロウラシル [] mg + 5%ブドウ糖液【500mL入】		48hr	48hr	48hr	
⑨ 生理食塩水 【20mL入】	—	—	—	CVホ ー有 患者のみ使用 (ロック用)	—	

【注意事項】

口内炎注意