

**XELIRI(Cape+CPT-11) + B-mab**

大腸癌 進行・再発1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m <sup>2</sup>	Ccr

- 【投与量】
- [1] ペバシズマブ (アバスチン)  
 体重が [ ] Kgなので → 体重(Kg) × 7.5 (mg/Kg) → [ ] mg → [ ] mg
  - [2] イリノテカン  
 体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 200 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg → [ ] mg
  - [3] カペシタビン (ゼロータ)  
 体表面積(BSA)が [ ] なので → → → [ ] → [ ]

【スケジュール】3週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目	16~21 日目	22 日目
内服	① <u>カペシタビン</u>	夕食後のみ	朝・夕食後	朝・夕食後	朝食後のみ	休薬	次のサイクル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート確保用	—	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL + デキサート3.3mg × 3管	15min	—	—	—	—	
	③ <u>ペバシズマブ</u> [ ] mg + 生理食塩水 【全量で100mL】	初回90min 2回目~60min	—	—	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	—	
	⑤ <u>イリノテカン</u> [ ] mg + 5%ブドウ糖液 【250mL】	120min	—	—	—	—	
	⑥ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	—	
⑦ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有患者のみ使用 (ロック用)	—	—	—	—		

【注意事項】

フッ化ピリミジン系薬(カペシタビン)⇒口内炎注意