

Cape + B-mab

大腸癌 進行・再発1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] ペバシズマブ (アバステン)
 体重が [] Kgなので → 体重(Kg) × 7.5 (mg/Kg) → [] mg → [] mg

[2] カペシタビン (ゼロータ)
 体表面積(BSA)が [] なので → → → [] → []

【スケジュール】3週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目	16~21 日目	22 日目
内服	① <u>カペシタビン</u>	夕食後のみ	朝・夕食後	朝・夕食後	朝食後のみ	—	次のサイクル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水【100mL入】	ルート確保用	—	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL + デキサート3.3mg × 3管	15min	—	—	—	—	
	③ <u>ペバシズマブ</u> [] mg + 生理食塩水【全量で100mL】	初回90min 60min	—	—	—	—	
	④ 生理食塩水【50mL入】	全開	—	—	—	—	
	⑤ 生理食塩水【20mL入】	CVポート有患者のみ使用(ロック用)	—	—	—	—	

【注意事項】

フッ化ピリミジン系薬(カペシタビン) → 口内炎注意