

GS(GEM+S-1)

胆道癌 進行・再発

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] S-1 (TS-1) 体表面積(BSA)が

[] なので → → → [] → []

[2] ゲムシタビン (ジェムザール)

[] m²なので → BSA(m²) × 1000 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 3週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目	16~21 日目	22 日目
内服	① S-1 []	夕食後のみ	朝・夕食後	朝・夕食後	朝食後のみ	休薬	次のサイクル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×2管	15min	—	—	—	—	
	③ ゲムシタビン [] mg + 生理食塩水【100mL】	30min	—	—	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	—	
	⑤ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	—	—	

【注意事項】

口内炎注意

ゲムシタビン → 30分以内で点滴(副作用防止)