

## GC(GEM+CDDP)

胆道癌

進行・再発

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m <sup>2</sup>	Ccr

【投与量】 [1] ゲムシタビン (ジェムザール)

体表面積(BSA) が        m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 1000 (mg/m<sup>2</sup>) =        mg →        mg

[2] シスプラチン (CDDP)

体表面積(BSA) が        m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 25 (mg/m<sup>2</sup>) =        mg →        mg

## 【スケジュール】 3週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~7 日目	8 日目	9~10 日目	11~21 日目	22 日目
内服	① イメンドカプセル	125mg 点滴前	80mg 朝食後	—	125mg 点滴前	80mg 朝食後	—	
	② デカドロン錠	—	15錠 毎食後	—	—	15錠 毎食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	ルート 確保用	—	—	次の サイ クル
	② グラニセトロンバッグ100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	15min	—	—	
	③ ゲムシタビン <span style="background-color: yellow;">      </span> mg + 生理食塩水【100mL】	30min	—	—	30min	—	—	
	④ シスプラチン <span style="background-color: yellow;">      </span> mg + 生理食塩水【全量で500mL】	120min	—	—	120min	—	—	
	⑤ ハルトマンpH8輸液 【500mL入】	フラッシュ兼 90min	—	—	フラッシュ兼 90min	—	—	
	⑥ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	

## 【注意事項】

副作用防止の為、ゲムシタビンは点滴30分以内で

投与直後のアナフィラキシー注意

異常あれば中止しDrCallする

シスプラチン → 腎障害に注意する