

GCS(GEM+CDDP+S-1)

胆道癌 進行・再発

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m <sup>2</sup>	Ccr

- 【投与量】 [1] ゲムシタビン (ジェムザール)  
 体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 1000 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg → [ ] mg
- [2] シスプラチン (CDDP)  
 体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 25 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg → [ ] mg
- [3] S-1 (TS-1) 体表面積(BSA)が [ ] なので → → → [ ] → [ ]

【スケジュール】 2週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~7 日目	8 日目	9~14 日目	15 日目
内服	① イメンドカプセル	125mg 点滴前	80mg 朝食後	—	—	—	次の サイ クル
	② デカドロン錠	—	15錠 毎食後	—	—	—	
	③ S-1	夕食後	朝・夕 食後	朝・夕 食後	朝食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	—	—	
	② グラニセトロンバッグ100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	—	—	
	③ ゲムシタビン [ ] mg + 生理食塩水【100mL】	30min	—	—	—	—	
	④ シスプラチン [ ] mg + 生理食塩水【全量で500mL】	120min	—	—	—	—	
	⑤ ハルトマンpH8輸液 【500mL入】	フラッシュ兼 90min	—	—	—	—	
⑥ 生理食塩水 【20mL入】	CVホ-ト有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	—	—	—	

【注意事項】

- 副作用防止の為、ゲムシタビンは点滴30分以内で投与直後のアナフィラキシー注意
- 異常あれば中止しDrCallする
- シスプラチン → 腎障害に注意する
- フッ化ピリミジン系薬 (S-1) → 口内炎注意