

CapeOX(Cape+OHP) +T-mab

胃癌

進行・再発1st HER2(+)

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m <sup>2</sup>	Ccr

- 【投与量】 [1] トラスツズマブ (T-mab)  
 ー選択ー 体重が [ ] Kgなので → 体重(Kg) × [ ] (mg/Kg) → [ ] mg → [ ] mg
- [2] オキサリプラチン  
 体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 130 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg → [ ] mg
- [3] カペシタビン (ゼロータ)  
 体表面積(BSA)が [ ] なので → → → [ ] → [ ]

【スケジュール】 3週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目	16~21 日目	22 日目
内服	① カペシタビン	夕食後のみ	朝・夕食後	朝・夕食後	朝食後のみ	休薬	次のサイクル
	② デカドロン錠0.5mg	ー	15錠 毎食後	ー	ー	ー	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート確保用	ー	ー	ー	ー	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	ー	ー	ー	ー	
	③ オキサリプラチン [ ] mg + 5%ブドウ糖液 【250mL】	120min	ー	ー	ー	ー	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	ー	ー	ー	ー	
	⑤ トラスツズマブ [ ] mg + 生理食塩水 【250mL】	初回 2回目~60min	ー	ー	ー	ー	
⑥ 生理食塩水 【50mL入】	全開	ー	ー	ー	ー		
⑦ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有患者のみ使用 (ロック用)	ー	ー	ー	ー		

【注意事項】

フッ化ピリミジン系薬 → 口内炎注意