

S-1 + CDDP

胃癌

進行・再発1st HER2(-)

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] S-1 (TS-1) 体表面積(BSA)が

[] なので → → → [] → []

[2] シスプラチン (CDDP)

体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 60 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 5週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~7 日目	8 日目	9 日目	10 日目	11~21 日目	22~ 日目	36 日目
内服	① S-1	朝・夕食後	朝・夕食後	朝・夕食後	朝・夕食後	朝・夕食後	朝・夕食後	休薬	
	② デカドロン錠0.5mg	—	—	—	15錠 毎食後	15錠 毎食後	—	—	
	③ イメンドカプセル	—	—	125mg 点滴前	80mg 朝食後	80mg 朝食後	—	—	
点滴	① ハルトマンpH8輸液【500mL入】	—	—	ルート確保兼 60min	—	—	—	—	次のサイクル
	② グラニセトロンバック100mL + デキサート3.3mg × 3管	—	—	15min	—	—	—	—	
	③ シスプラチン [] mg + 生理食塩水【全量で500mL】	—	—	120min	—	—	—	—	
	④ ハルトマンpH8輸液 + フロセミド20mg × 1管	—	—	6hr	—	—	—	—	
	⑤ 5%ブドウ糖輸液【500mL入】	—	—	6hr	6hr	—	—	—	
	⑥ ハルトマンpH8輸液【500mL入】	—	—	6hr	6hr	6hr	—	—	
	⑦ (追加分)ハルトマンpH8輸液【500mL入】	—	—	尿量1500未満で追加 6hr	尿量1500未満で追加 6hr	尿量1500未満で追加 6hr	—	—	
	⑧ 生理食塩水【20mL入】	—	—	—	—	CVポート有患者のみ使用(ロック用)	—	—	

【注意事項】

腎障害対策 畜尿 (シスプラチン開始日から)

シスプラチン{CDDP}後3日間は1日1500mLの尿量を目標とし、補液に加えて水分摂取を勧める。

1日あたり1500mL以下の場合、ハルトマン500mLを1本追加する。

フッ化ピリミジン系薬(S-1)⇒口内炎に注意