

IRIS(イリノテカン+S-1)

胃癌 進行・再発2nd(エビデンス弱)
大腸癌 進行・再発1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] S-1 (TS-1) 体表面積(BSA)が

[] なので → → → [] → []

[2] イリノテカン

体表面積(BSA)が [] m²なので → BSA(m²) × 125 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 4週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目	16~28 日目	29 日目
内服	① S-1 []	夕食後のみ	朝・夕食後	朝・夕食後	朝食後のみ	休薬	次のサイクル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート確保用	—	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×2管	15min	—	—	—	—	
	③ イリノテカン [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL】	90min	—	—	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	—	
	⑤ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有患者のみ使用(ロック用)	—	—	—	—	

【注意事項】

フッ化ピリミジン系薬 → 口内炎注意