

CPT-11+CDDP

胃癌

進行・再発2nd(エビデンス弱)

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m <sup>2</sup>	Ccr

【投与量】 [1] イリノテカン (CPT-11)

体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 60 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg → [ ] mg

[2] シスプラチン (CDDP)

体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 30 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg → [ ] mg

【スケジュール】 2週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目
①	デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	次の サイ クル
	② イメンドカプセル	125mg 点滴前	80mg 朝食後	—	
点 滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	
	③ イリノテカン [ ] mg+ 生理食塩水【500mL】	90min	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	
	⑤ シスプラチン [ ] mg+ 生理食塩水【全量で500mL】	90min	—	—	
	⑥ ハルトマンpH8輸液 【500mL入】	フラッシュ兼 90min	—	—	
	⑦ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—	—	

【注意事項】

腎障害注意