

**GEM(Gemcitabine)単独**

膵臓癌 術後補助 2nd  
胆道癌 再発・進行

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m <sup>2</sup>	Ccr

【投与量】 [1] ゲムシタビン (ジェムザール)

体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので → BSA(m<sup>2</sup>) × 1000 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg → [ ] mg

【スケジュール】 4週間毎(4週間で1コース、膵臓癌術後補助は6コースまで)

↓治療内容		1 日目	2~3 日目	4~7 日目	8 日目	9~10 日目	11~14 日目	15 日目	16~17 日目	18~28 日目	29 日目
内服	① デカドロン錠	—	15錠 毎食後	—	—	15錠 毎食後	—	—	15錠 毎食後	—	次の サイ クル
	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	ルート 確保用	—	—	ルート 確保用	—	—	
点滴	② グラニセトロンバッグ100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	15min	—	—	15min	—	—	
	③ ゲムシタビン [ ] mg +生理食塩水【100mL】	30min	—	—	30min	—	—	30min	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開 フラッ シュ用	—	—	全開 フラッ シュ用	—	—	全開 フラッ シュ用	—	—	
⑤ 生理食塩水 【20mL入】	CVポ ート有 患者のみ (ロック用)	—	—	CVポ ート有 患者のみ (ロック用)	—	—	CVポ ート有 患者のみ (ロック用)	—	—		

【注意事項】

副作用防止の為、ゲムシタビンは点滴30分以内で