

GnP(GEM+nab-PTX)

膵臓癌 進行・再発 1st

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

- 【投与量】 [1] nabパクリタキセル (アブラキサン)
 体表面積(BSA) が [] m²なので⇒ BSA(m²) × 125 (mg/m²) = [] mg → [] mg
- [2] ゲムシタビン (ジェムザール)
 体表面積(BSA) が [] m²なので⇒ BSA(m²) × 1000 (mg/m²) = [] mg → [] mg

【スケジュール】 4週間毎

↓治療内容		1 日目	2~3 日目	4~7 日目	8 日目	9~10 日目	11~14 日目	15 日目	16~17 日目	18~28 日目	29 日目
内服	① レスタミン錠10mg	5錠 点滴前	—	—	5錠 点滴前	—	—	5錠 点滴前	—	—	
	② デカドロン錠	—	15錠 毎食後	—	—	15錠 毎食後	—	—	15錠 毎食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	ルート 確保用	—	—	ルート 確保用	—	—	
	② グラニセトロンバッグ100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	15min	—	—	15min	—	—	
	③ nabパクリタキセル FALSE mg +生理食塩水【20mL】	30min	—	—	30min	—	—	30min	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開 フラッシュ用	—	—	全開 フラッシュ用	—	—	全開 フラッシュ用	—	—	
	⑤ ゲムシタビン FALSE mg +生理食塩水【100mL】	30min	—	—	30min	—	—	30min	—	—	
	⑥ 生理食塩水 【50mL入】	全開 フラッシュ用	—	—	全開 フラッシュ用	—	—	全開 フラッシュ用	—	—	
	⑦ 生理食塩水 【20mL入】	CVポート有 患者のみ (ロック用)	—	—	CVポート有 患者のみ (ロック用)	—	—	CVポート有 患者のみ (ロック用)	—	—	

次のサイクル

【注意事項】

副作用防止の為、ゲムシタビンは点滴30分以内で
 投与直後のアナフィラキシー注意
 異常あれば中止しDrCallする

nab-パクリタキセル⇒包装開封後のバイアルも箱に入れて保存。特定生物由来製品の為、
 医薬品名(販売名)・その製造番号又は製造記号(ロット番号)・使用年月日・使用した
 患者名・住所を記録20年保管
 シリンジポンプで・フィルター**使用せず**投与する(フィルターに目詰まりする為)