

**FOLFIRINOX**

膵臓癌 進行・再発 2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m <sup>2</sup>	Ccr

- 【投与量】
- [1] オキサリプラチン  
体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので ⇒ BSA(m<sup>2</sup>) × 85 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg ⇒ [ ] mg
  - [2] イリノテカン  
体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので ⇒ BSA(m<sup>2</sup>) × 180 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg ⇒ [ ] mg
  - [3] レボホリナート  
体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので ⇒ BSA(m<sup>2</sup>) × 200 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg ⇒ [ ] mg
  - [4] フルオロウラシル(急速) (5-FU)  
体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので ⇒ BSA(m<sup>2</sup>) × 400 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg ⇒ [ ] mg
  - [5] フルオロウラシル(持続) (5-FU)  
体表面積(BSA) が [ ] m<sup>2</sup>なので ⇒ BSA(m<sup>2</sup>) × 2400 (mg/m<sup>2</sup>) = [ ] mg ⇒ [ ] mg

【スケジュール】 2週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2 日目	3 日目	4~14 日目	15 日目
内服	① イメンドカプセル	125mg 点滴前	80mg 朝食後	80mg 朝食後	—	次のサイクル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	15錠 毎食後	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL +デキサート3.3mg×3管	15min	—	—	—	
	③ オキサリプラチン [ ] mg +					
	④ 5%ブドウ糖液【250mL】	120min	—	—	—	
	同 ⑤ レボホリナート [ ] mg +					
	⑥ 5%ブドウ糖液【250mL】	120min	—	—	—	
	⑦ イリノテカン [ ] mg +					
	⑧ 5%ブドウ糖液【250mL】	③④開始 30分後より 90min	—	—	—	
⑥ フルオロウラシル [ ] mg +						
⑦ 5%ブドウ糖液【50mL】	15min	—	—	—		
⑦ フルオロウラシル [ ] mg +						
⑧ 5%ブドウ糖液【500mL】	46hr	46hr	46hr	—		
⑧ 生理食塩水 【20mL入】	—	—	CVポート有 患者のみ使用 (ロック用)	—		

【注意事項】

オキサリプラチンは必ずブドウ糖で溶解する。  
口内炎注意