



GEM+S-1

膵臓癌

進行・再発

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] S-1 (TS-1)

—選択—

BSA(m²) × (mg/m²) = mg →

[2] ゲムシタビン (ジェムザール)

—選択—

BSA(m²) × (mg/m²) = mg → mg

【スケジュール】 3週間毎

		1	2~3	4~7	8	9~10	11~14	15	16~21	22	次のサイクル
↓ 治療内容		日目	日目	日目	日目	日目	日目	日目	日目	日目	
内服	① S-1	夕食後のみ	朝・夕食後	朝・夕食後	朝・夕食後	朝・夕食後	朝・夕食後	朝食後のみ	休薬		
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	15錠 毎食後	—	—	—		
点滴	① 生理食塩水【100mL入】	ルート確保用	—	—	ルート確保用	—	—	—	—		
	② グラニセトロンバック100mL + デキサート3.3mg×2管	15min	—	—	15min	—	—	—	—		
	③ ゲムシタビン mg + 生理食塩水【100mL】	30min	—	—	30min	—	—	—	—		
	④ 生理食塩水【50mL入】	全開	—	—	全開	—	—	—	—		
	⑤ 生理食塩水【20mL入】	CVポート有患者のみ	—	—	CVポート有患者のみ	—	—	—	—		

【注意事項】

口内炎注意

ゲムシタビン → 30分以内で点滴(副作用防止)